



BAGOLY F1

HR Tm2

Hibrid cu creștere nedeterminată, fructe atârinate, albe, cu forma blocky puțin alungită, pulpa deosebit de cărnoasă, 3-4 lobi. Masa fructului este de 150-190 g, la maturitatea de consum, alb, la maturitatea fiziologică roșu.

Creștere semiviguroasă, planta deosebit de viguroasă, ramură schelet și sistem radicular gros. Rezistă foarte bine la virusul mozaic al tutunului și la virusul Óbuda al ardeiului.

Recomandat pentru cultivare în spații protejate și în câmp liber.

Cel mai bine se cultivă tăiat pe 1 sau 2 brațe, respectiv, lângă cordon, fără tăiere. A se planta la locul definitiv între 15 martie – 15 iulie. În spații protejate 4-4,5 plante, în câmp liber 5-6 plante pe m².

Fructele de calitate excelentă și de dimensiuni mari rezistă foarte bine la transport, pot fi ținute timp îndelungat pe tarabă, se pretează pentru export.



Fertilizare lichidă în sere neîncălzite

Perioadă	Proporția N:P:K	Calciu	Îngrășăminte chimice/săptămână
Plantare	1:2:1 fertilizare starter		0,2 %
Până la prima legare	1:1:1,2	++	0,8 dkg/m ²
Până la a doua legare	1,3:0,5:1	++	1,2 dkg/m ²
Până la prima recoltare	1,5:0,5:1	+++	1,8 dkg/m ²
Pe perioada recoltării	1:0,3:1,5	++	2 dkg/m ²

Fertilizare lichidă în câmp liber

Perioadă	Proporția N:P:K	Calciu	Îngrășăminte chimice/săptămână
Plantare	1:2:1 fertilizare starter		0,2 %
Până la a doua legare	1:1:1,2	++	0,8 dkg/m ²
Până la prima recoltare	1,3:0,5:1	++	1,2 dkg/m ²
Pe perioada recoltării	1,5:0,5:1	+++	1,5 dkg/m ²
	1:0,3:1,5	++	1,5 dkg/m ²

Datele privind fertilizarea cu îngrășăminte lichide sunt cu caracter informativ. Pentru stabilirea exactă a cantităților se vor lua în considerare rezultatele analizei de sol și condițiile de cultivare (anotimp, condiții meteorologice, instalații de cultivare, fitotehnie etc.)