

# BÓBITA F1



Hibrid cu creștere nedeterminată, bacă deosebit de mare, pereți cărnoși. Masa fructului este de 140-180 g, la maturitate de consum alb, la maturitatea fiziologică portocaliu.

Productivitate ridicată, creștere semiviguroasă, ramură schelet și sistem radicular gros. Nu este sensibil la carența de calciu. Recomandat atât pentru cultivare în spații protejate cât și în câmp liber.


Cel mai bine se cultivă tăiat pe 1 sau 2 brațe, respectiv, lângă cordon, fără tăiere. În spații protejate, poate fi cultivat cu sau fără încălzire, plantarea în câmp liber se recomandă în perioada 15 martie - 15 iulie.

În spații protejate 4-5 plante, în câmp liber 5-6 plante pe m<sup>2</sup>.

Unul dintre cei mai tipici reprezentanți ai formei blocky. Soi timpuriu, cărnos, de o calitate excelentă, se pretează pentru consum în formă proaspătă și pentru export; poate fi ținut vreme îndelungată pe tarabă. Sortimentul preferat al producătorilor și consumatorilor.

## Suplimentare elemente nutritive

Datorită productivității sale ridicate, tinde să formeze prea multe fructe, de aceea în perioadele critice poate fi necesară corectarea raportului N:K la 1,3:1. Pot apărea perioade în care producția trebuie repornită (după recoltări majore sau din cauza condițiilor de mediu nefavorabile). În aceste situații se poate administra o rețetă cu fosfor și potasiu N:P:K = 1:2:2



## Fertilizare lichidă în cult. tăiată

Perioadă	Proporția N:P:K	Calciu	Îngrășăminte chimice/săptămână
Plantare	1:2:1 fertilizare starter		0,2 %
Până la prima legare	1:1:1,5	+	0,8 dkg/m <sup>2</sup>
Până la a doua legare	1:0,5:1,5	+	1,2 dkg/m <sup>2</sup>
Până la prima recoltare	1,2:0,5:1	++	1,5 dkg/m <sup>2</sup>
Pe perioada recoltări	1:0,5:1,2	++	1,8-2 dkg/m <sup>2</sup>

## Fertilizare lichidă în cult. Palisată (cordon)

Perioadă	Proporția N:P:K	Calciu	Îngrășăminte chimice/săptămână
Plantare	1:2:1 fertilizare starter		0,2 %
Până la prima legare	1:1:1,5	+	0,8 dkg/m <sup>2</sup>
Până la a doua legare	1:0,5:1,3	+	1,5 dkg/m <sup>2</sup>
Până la prima recoltare	1:0,5:1	++	2 dkg/m <sup>2</sup>
Pe perioada recoltări	1:0,5:1-1,2	++	2,5-3 dkg/m <sup>2</sup>

Datele privind fertilizarea cu îngrășăminte lichide sunt cu caracter informativ. Pentru stabilirea exactă a cantităților se vor lua în considerare rezultatele analizei de sol și condițiile de cultivare (anotimp, condiții meteorologice, instalații de cultivare, fitotehnie etc.)