



# KINCSEM F1

HR Tm2

Hibrid cu creștere nedeterminată, atârnat, alb, dulce, cu forma conică, umeri lași, bace mari, uniforme, pentru cultivare în spații protejate. Masa fructului este de 100-130 g, la maturitatea de recoltat este alb, iar la maturitatea fiziologică, roșu. Distanță internodală scurtă. Dezvoltare rapidă, vigurozitate de creștere medie, productivitate ridicată. Datorită necesarului de lumină redus, leagă foarte bine și în perioadele de iarnă cu lumină slabă. Rezistă foarte bine la virusul mozaic al tutunului și la virusul Óbuda al ardeiului. Unul dintre cele mai potrivite soiuri pentru cultura intensivă, foarte timpurie (de iarnă). Poate fi cultivat în orice perioadă a anului, în spații de cultură încălzite sau neîncălzite. Fructele extra sunt situate pe ramura principală și în apropierea acesteia. Cel mai eficient se cultivă tăiat pe 1 braț, respectiv, fără tăiere, lângă cordon. La culturile de iarnă se recomandă 4-5, primăvara 5, iar la culturi târzii, 6 plante/m<sup>2</sup>. Este unul dintre soiurile cu umerii cei mai lași. Produce multe fructe, cu creștere rapidă.

## Suplimentare elemente nutritive

Soi echilibrat, fără excese vegetative sau generative. În timpul procesului de producție pot apărea perioade (sensibilitate la condițiile de lumină slabe primăvara devreme și toamna, răcire rapidă după o perioadă caniculară etc.) în care inflorescența și legarea fructelor trebuie stimulată prin surplus de fosfor și potasiu, pe o durată de 10-14 zile (N:P:K=1:2:2) Nu este sensibil la carența de calciu; dacă totuși prezintă simptome de acest gen, de obicei avem de a face cu leziuni grave la nivelul rădăcinilor.



## Fertilizare lichidă în cult. tăiată

Perioadă	Proporția N:P:K	Calciu	Îngrășăminte chimice/săptămână
Plantare	1:2:1 fertilizare starter		0,2 %
Până la prima legare	1:1:1,2	+	0,8 dkg/m <sup>2</sup>
Până la a doua legare	1:0,5:1	+	1,2 dkg/m <sup>2</sup>
Până la prima recoltare	1:0,5:1,2-1,5	++	1,5 dkg/m <sup>2</sup>
Pe perioada recoltării	1:0,5:1-1,2	++	1,4-2 dkg/m <sup>2</sup>

## Fertilizare lichidă în cult. palisată (cordon)

Perioadă	Proporția N:P:K	Calciu	Îngrășăminte chimice/săptămână
Plantare	1:2:1 fertilizare starter		0,2 %
Până la prima legare	1:1:1,2	+	0,8 dkg/m <sup>2</sup>
Până la a doua legare	1,2:0,5:1	+	1,2 dkg/m <sup>2</sup>
Până la prima recoltare	1:0,5:1,2	++	2 dkg/m <sup>2</sup>
Pe perioada recoltării	1:0,5:1-1,2	++	2-2,5 dkg/m <sup>2</sup>

Datele privind fertilizarea cu îngrășăminte lichide sunt cu caracter informativ. Pentru stabilirea exactă a cantităților se vor lua în considerare rezultatele analizei de sol și condițiile de cultivare (anotimp, condiții meteorologice, instalații de cultivare, fitotehnie etc.)