




RĂRIREA DE TIP RUSKÓ

Prin descrierea procedeului de tăiere de mai jos, elaborat de noi și verificat în diferite condiții de cultură, dorim să venim în ajutorul producătorilor în vederea creșterii însemnate a producției.



(Stânga) Rupem bace care apare la prima ramificație, de îndată ce a atins mărimea de 2 cm. Astfel, planta va avea randament mai mare la nivelurile superioare.

(Dreapta) După câteva săptămâni culegem producția, când bacele crescute la nivelurile doi și mai sus au ajuns bune de cules. Culegem doar fructele care au atins mărimea dorită (indicate cu cifra 1).

Bacele mai mici, încă în creștere (indicate cu cifra 2) deocamdată rămân pe tulpină pentru a fi culese – în funcție de ritmul de dezvoltare – peste 7-10 zile, când majoritatea lor a atins mărimea de culegere. În timpul celei de a doua culegeri se adună toate bacele, sacrificând pe cele care nu s-au dezvoltat suficient. Lăsăm doar fructele foarte mici, dacă nu au atins dimensiunea de 1,5-2 cm.



Prin aplicarea metodei prezentate planta nu-și mai irosește energia cu bacele care au atins faza de culegere, iar la nivele mai înalte va avea un randament mai mare. Un alt avantaj al procedeului este faptul că la speciile cu distanțe scurte între noduri este mai redus pericolul înțepenirii bacăi, deci recolta va fi mai frumoasă și mai regulată.

Tulpinile pot da, de-a lungul întregii perioade de cultivare, un plus de producție chiar și de 40%.



În figurile de pe partea cealaltă putem vedea ardeiul de tip Blocky, însă metoda poate fi aplicată la fel de eficient și la oricare alt tip.

Mărimea corespunzătoare pentru rupere a bachelor care se dezvoltă la prima ramificație, la diferite tipuri de ardei (Mărime naturală).

DUNA-R Kft